

CO-TRIMOXAZOLE

Pediatric Oral Suspension 100 mL

COMPOSITION :

Each 5 mL contains :

Trimethoprim USP	40 mg
Sulphamethoxazole USP	200 mg

* DESCRIPTION :

CO-TRIMOXAZOLE is a dual composition bactericidal chemotherapeutic product. It acts by blocking certain enzymes acting within bacterial metabolism involving biosynthesis of folic acid. CO-TRIMOXAZOLE is rapidly absorbed from the absorbed from the GIT following oral administration. Plasma levels in the blood occur between 1 - 4 hours after ingestion & ingestion and the level attained is dose-related. The half - life is approximately 9 - 10 hours.

* INDICATIONS:

- Respiratory tract infections : tonsillitis, sinusitis, pharyngitis, acute and chronic bronchitis, bronchiectasis and pneumonia.
- Genito - urinary tract infections :
Pyelonephritis, pyelitis and urethritis
- Gastro - intestinal tract infections :
Typhoid , paratyphoid , enteritis and bacillary dysentery.
- Skin infections: Abscesses, furuncles , pyoderma and wound infections.
- Other bacterial infections : Septicemia, acute and chronic osteomyelitis, traveler's diarrhea.

* DOSAGE & ADMINISTRATION:

CO-TRIMOXAZOLE is administered preferably with some food or drink every 12 hours as follows :

Age	Dosage
infants 1 - 12 months	2.5 - 5 mL.
Children 1 - 6 years	5 - 10 mL.
Children 6 - 12 years	10 - 20 mL.

RESTRICTIONS ON USE :

Contraindications

- Hypersensitivity to sulfonamides and trimethoprim.
- Patients with serious hematological disorders.
- CO-TRIMOXAZOLE should not be given to premature babies or to full - term infants during the first few weeks of life.

Precautions

- CO-TRIMOXAZOLE should be discontinued if a skin rash appears.
- In case of renal impairment, a reduced dosage should be given.

* SIDE EFFECTS :

CO-TRIMOXAZOLE is well tolerated at the recommended doses and any side effects that might occur will be mild & transient, these may include gastrointestinal disturbances (nausea, anorexia and vomiting), skin rash and some hematological changes.

* STORAGE INSTRUCTIONS :

- Store below 25° C. Protect from light.

* PRESENTATION :

Bottles of 100 mL.

INSTRUCTIONS TO THE PATIENT

- Medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instruction of the pharmacist who sold the medication.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.

Keep medicament out of reach of children.

PHARMADEX S.A.L.
KAHALE - LEBANON



الجرعة	العمر
٢,٥ - ٥ مل	الرضع من ١ - ١٢ شهر
٥ - ١٠ مل	الأطفال من ١ - ٦ سنوات
١٠ - ٢٠ مل	الأطفال من ٦ - ١٢ سنة

* القيود على الاستعمال:

موانع الإستعمال

- فرط الحساسية تجاه السلفوناميد وترايميثوبريم .
- المرض المصابين باعتلالات دموية خطيرة .
- يجب عدم إعطاء كو-تريموكسازول للأطفال الخداج أو الأطفال مكتملي النمو خلال الأسابيع الأولى من حياتهم.

المحاذير

- يجب إيقاف تناول كو-تريموكسازول إذا حدث طفح جلدي .
- يجب تخفيض الجرعة المعطاة في حالات القصور الكلوي .

* الآثار الجانبية :

- يمكن تحمل كو- تريريموكسازول بصورة جيدة بالجرعات الموصى. وإذا طرأت أية تأثيرات جانبية فإنها تكون غالبا خفيفة ومؤقتة. وقد تشمل اضطرابات في الجهاز الهضمي (الغثيان وفقدان الشهية والقئ)، الطفح الجلدي وبعض التغيرات الدموية .

* تعليمات التخزين :

- يحفظ في درجة حرارة لا تتعدى ٢٥ م بعيدا عن الضوء .
- * الشكل الصيدلاني : عبوة سعة ١٠٠ مل

تعليمات للمريض

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة من تلقاء نفسك.
- احفظ الدواء بعيدا عن متناول الأطفال.

PHARMADEX S.A.L.
KAHALE - LEBANON



كو-تريموكسازول شراب معلق الأطفال

١٠٠ مل

التركيب :

كل ٥ مل محتوي على:

٤٠ ملغم

٢٠٠ ملغم

ترايميثوبريم

سلفامينوكسازول

* الوصف:

كو- تريموكسازول عبارة عن علاج كيميائي قاتل ثانوي التركيب يكون مفعوله بواسطة منع إنزيمات خاصة تعمل خلال عملية الاستقلاب البكتيري بما فيها التخليق الحيوي لحمض الفولينيك. يمتص كو-تريموكسازول سريعا من الجهاز الهضمي بعد تناوله عن طريق الفم. إن ذروة مستواه في الدم تحدث بين ساعة ١ - ٤ ساعات والمستوى الذي يصله الدواء مرتبط بالجرعة. ويبلغ العمر النصفى حوالي ٩ - ١٠ ساعة.

* دواعي الإستعمال:

- التهابات الجهاز التنفسي : التهاب اللوزتين والجيوب الأنفية والبلعوم والالتهاب الشعبي الرئوي الحاد والمزمن والتمدد الشعبي وذات الرئة .
- التهابات الجهاز البولي - التناسلي: التهاب الكلية وحوضها والتهاب المثانة.
- التهابات الجهاز الهضمي : التيفوئيد ونظيرة التيفونيد والتهاب الأمعاء والدوسنطاريا العسوية.
- التهابات الجلدية : الخراج والدمامل والتهاب الجلد المتقيح والتهابات الجروح.
- التهابات بكتيرية أخرى: التسمم الدموي البكتيري والتهاب العظام والإسهال الذي يصيب المسافرين.
- * الجرعة وطريقة الاستعمال:
- يفضل تناول كو-تريموكسازول مع قليل من الطعام أو الشراب كل ١٢ ساعة كالاتي :