

«TENIADEX»

- Composition** : 5 - chloro - N - (2' - chloro - 4' - nitrophenyl) salicylamide.
- Indication** : Taenia saginata (boeuf). Taenia solium (porc.). Diphyllbothrium latum (poisson), H. nana
- Mode d'emploi** : Mastiquer les comprimés complètement et les avaler avec un peu d'eau. Pour les jeunes enfants, pulvériser les comprimés finement.
- Posologie** : Les comprimés sont pris après un léger petit déjeuner. La veille au soir, n'absorber que des liquides non alcoolisés (jus de fruits).
L'alcool est défendu durant le traitement.

1) T. saginata. T. solium, D. latum: une seule dose suffit.

Adultes et enfants de plus de 6 ans : 4 comprimés
Enfants de 2 à 6 ans : 2 comprimés
Enfants de moins de 2 ans : 1 comprimé

Une purge prise 2 heures plus tard assure une complète expulsion du Taenia. Sans la purgation, le Taenia sera rejeté en fragments les jours suivants.

2) H. nana Traitement sur 7 jours

Premier jour:

Adultes et enfants de plus de 6 ans : 4 comprimés
Enfants de 2 à 6 ans : 2 comprimés
Enfants de moins de 2 ans : 1 comprimé

Les 6 jours suivants :

Adultes et enfants de plus de 6 ans : 2 comprimés
Enfants de 2 à 6 ans : 2 comprimés
Enfants de moins de 2 ans : ½ comprimé

Présentation : Boîtes de 4 comprimés dosés à 0,5g



PHARMADEX S.A.L.
KAHALE - LIBAN

«TENIADEX»

N - (2 - chloro - 4' - Nitrophenyl) - 5 chloro - salicylamide Teniadex is a new taenifuge and has an active action against Taenia Solium and Saginata. Its advantages are the following :

It is completely harmless without side effects. No interruption of occupation. No contra-indication of any kind.

DOSAGE :

The evening : only fluids should be taken such as fruit juice or soups, the next morning tablets should be chewed and swallowed with water.

Adults and Children over 8 years : two tablets, and one hour later two other tablets.

Children from 2 to 8 years : one tablet, and one hour later another tablet.

Children under 2 years : half tablet, and one hour later another half.

Breakfast may be taken two hours after the last tablet. To achieve rapid expulsion and before breakfast a mild purge may be taken two hours after the last dose of tablets.

PACKING : Boxes of 4 tablets of 0,5 g.



PHARMADEX S.A.L.
KAHALE - LIBAN

«تينيا دكس»

الكبار والاطفال فوق ٦ سنوات ٤ حبات
الاطفال ما بين ٢ - ٦ سنوات ٢ حبتين
الاطفال الذين تقل اعمارهم عن الستين حبة واحدة
والايام الست التالية:
الكبار والاطفال فوق ٦ سنوات ٢ حبتين
الاطفال ما بين ٢ - ٦ سنوات ٢ حبة واحدة
الاطفال الذين تقل اعمارهم عن ستين $\frac{1}{4}$ نصف حبة

التعبئة كل حبة تحتوي على ٥٠٠ ملغ من : ٥ كلورو
(٢ كلور - ٤ نيتروفنيل) ساليسلاميد



فارمادكس ش.م.ل.
الكحالة - لبنان

دواء الدودة الوحيدة (تينيا)

التركيب كل حبة تحتوي على ٥٠٠ ملغ من : ٥ كلورو
(كلور - ٤ نيتروفنيل) ساليسلاميد

حالات الاستعمال يؤخذ في حالات الدودة الوحيدة الاتية :

تينيا البقر - تينيا الخنزير
تينيا الاسماك - تينيا القرمة

كيفية الاستعمال تؤخذ حبات " تينيا دكس " صباحاً بعد
الفطور الخفيف ممزوج الحبات تماماً وبشكل
جيد حتى يتكون في الفم سائل كسيف نشائي
ويبلع مع قليل من الماء.

الجرعة في حالات التينيا البقر وتينيا الخنزير وتينيا
الاسماك تكفي جرعة واحدة من تينيا دكس
كالاتي :

الكبار والاطفال ما فوق ٦ سنوات ٤ حبات
الاطفال ما بين ٢ - ٦ سنوات ٢ حبتين
الاطفال الذين تقل اعمارهم عن ستين حبة واحدة
ان اخذ مسهل بعد ساعتين من تناول الدواء بصرح
الدودة بكاملها وبسرعة والا تطرح الدودة خلال الايام
القادمة بشكل قطع صغيرة امتناع الكحول مدة
المعالجة.

في حالة تينيا القرمة يؤخذ تينيا دكس لمدة سبعة
ايام كالاتي :
اول يوم.