

# FEBRIDEX<sup>®</sup>

## Paediatric Suspension

Anti-Inflammatory, Antirheumatic, Analgesic, Antipyretic

### Composition:

Each teaspoonful (5 ml) contains : ibuprofen 100 mg.

### Properties :

The active component of Febridex<sup>®</sup> is a non-steroidal anti-inflammatory agent having marked anti-inflammatory, antirheumatic, analgesic and antipyretic properties.

It is postulated to act by inhibiting prostaglandins biosynthesis which are known to have a major role in inflammation, pain and fever.

Febridex<sup>®</sup> has a rapid absorption, and thus it will give a fast effect

Febridex<sup>®</sup> Suspension is a sweet, fruity-flavoured preparation, especially formulated for paediatric use. It is characterized by being extremely well tolerated.

### Indications :

Febridex<sup>®</sup> is indicated in the treatment of rheumatoid arthritis, osteoarthritis, ankylosing spondylitis and allied conditions, soft-tissue injuries, and nonrheumatic inflammatory conditions such as athletic injuries, bursitis, tendonitis, synovitis and capsulitis. Painful conditions including dysmenorrhea, dental and post-operative pain as well as feverishness are also relieved by Febridex<sup>®</sup>

### Paediatric Use :

Febridex<sup>®</sup> Suspension is mainly recommended for children whenever a rapid effect is required to

- reduce elevated body temperature
- relief from pain
- relieve from inflammatory conditions.

### Dosage :

Children and Infants :

body weight is recommended .

Children 5-12 years . : 10 ml suspension 3-4 times a day.

Children 1-5 years : 5 ml suspension 3-4 times a day.

Infants 0-1 year : dose to be decided by the physician.

For geriatric use, the suspension form can be used whenever tablets can not be easily swallowed.

### Contra - indications :

Ibuprofen should not be given to patients showing severe hypersensitivity reactions to aspirin or other non-steroidal anti-inflammatory agents

### Precautions :

Ibuprofen should be given cautiously to patients having asthma, peptic ulcer, hepatic or renal function impairment, or hemophilia. Caution is also recommended when Ibuprofen is given to pregnant Women.

### Side effects :

Ibuprofen is usually well tolerated. Some minor side effects have been occasionally reported, such as skin rashes, abdominal pain, heartburn, dizziness, and nausea.

Suspension : Bottles of 125 ml .

### **THIS IS A MEDICAMENT**

- Medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions, is dangerous for you .
- Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament.
- The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.

**Keep all medicines out of the reach of children**

Store at a temperature between 15°C - 25°C ,  
Protected from light .

**PHARMADEX S.A.L.**  
KAHALE - LEBANON



## فابريدكس®

### فابريدكس شراب معلق للأطفال

لعلاج التهابات الروماتيزم ومسكن ومخفض للحرارة.

#### التركيب:

فابريدكس معلق للأطفال كل ملعقة (٥ مليلتر) تحتوي على  
أيبوبروفين ١٠٠ ملغم .

#### الخواص:

يحتوي فابريدكس على أيبوبروفين وهو عامل غير ستيرويدي مضاد  
للتهابات ويعمل عن طريق منع تخليق البروستاجلاندين المعروف  
بدوره الرئيسي في حدوث التهاب الألم والحرارة.  
يتميز فابريدكس بسرعة امتصاصه من قبل الجهاز الهضمي مما  
يضمن سرعة مفعوله العلاجي .  
فابريدكس شراب معلق يتميز بطعمه المقبول ونكهته المستساغة  
وهو محضر خصيصاً للاستعمال من قبل الأطفال  
فابريدكس شراب معلق جيد التحمل عادة .

#### دواعي الإستعمال

يوصف فابريدكس في علاج حالات التهاب المفاصل الروماتيزمي  
والفصال العظمي ( التهاب العظمي المفصلي ) والتهابات العمود الفقري  
والحالات المرتبطة بها .

- اصابات النسجة الرخوة.

- حالات الألم الناتج عن التهابات غير الروماتيزمية مثل الاصابات

الرياضية والتهابات الكيس الزلالي والتهابات الأغشية المصلية

والمحيطة بالمفاصل والتهاب الأوتار .

.. آلام الطمث وآلام الأسنان والآم ما بعد العمليات الجراحية،

ولتخفيف الحرارة المرتفعة .

#### دواعي الاستعمال للأطفال :

- يعطي فابريدكس شراب لأحداث مفعول سريع في الآتي:

- تخفيف درجات الحرارة المرتفعة.

- تسكين الألم.

- تخفيف الالتهابات.

#### الأطفال والرضع :

- الأطفال ٥-١٢ سنة ١٠ مليلتر معلق ٣-٤ مرات يومياً

- الأطفال ١-٥ سنوات : ٥ مليلتر معلق ٣-٤ مرات يومياً

- الرضع أقل من سنة : تقرر الجرعة حسب تعليمات الطبيب المعالج

#### موانع الاستعمال :

لا يجب استخدام الأيبوبروفين للمرضى ذوي الحساسية المفرطة  
للأسبرين أو للأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية .

#### الاحتياطات :

يجب اعطاء الأيبوبروفين بحذر لمرضى الربو وفرحة الجهاز الهضمي  
والمرضى المصابين بقصور في وظائف الكلى أو الكبد ومرضى  
الهيموفيليا، ويجب الحذر أيضاً عند استعمال الأيبوبروفين للحوامل .

#### التفاعلات الدوائية

- حيث أنه يمكن أن يزيد استخدام الأيبوبروفين من زيادة تركيز  
الديجوكسين في المصل لذلك يجب تخفيض جرعة الديجوكسين  
إذا تم تعاطيه مع الأيبوبروفين .

- يجب أيضاً "متابعة المرضى الذين يستعملون موانع تجلط الدم  
مثل الكومارين.

- يجب ضبط جرعة مضادات السكر الفموية عند استخدامها مع  
الأيبوبروفين حيث أن الأيبوبروفين يزيد من فاعليتها لخفض  
مستويات السكر في الدم .

- الأيبوبروفين عامة جيد التحمل ولكن يمكن حدوث اعراض  
جانبية نادرة مثل طفح جلدي وآلم بالبطن وحرقة وغثيان ودوخة

#### العوارض

شراب معلق : زجاجة ١٢٥ مليلتر

#### (ان هذا الدواء)

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً  
للتعليمات يعرض للخطر .

- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريق الاستعمال المنصوص عليها  
وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لذلك.

- فالطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وبنفعه وضرره

- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك

- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية

احفظ الدواء بعيداً عن متناول الأطفال

- تخزين حرارة لا تتجاوز ١٥° - ٢٥°

- رج الفنتينة جيداً قبل الإستعمال

فارمادكس ش.م.ل.  
الكحاله - لبنان

