

كسولات اندرميل اندميثاسين.

ان مستحضر اندمويل (اندميثاسين) هو علاج غير ستارويدي فعال جدا مضاد للالتهابات يتمتع بخواص واضحة في تسكين الالام وتخفيض الحرارة. أما كيفية تأدية مفصوله فهي غير معروفة كما الحال مع سائر العقاقير المضادة للالتهابات. الا ان اثره الطيبي ليس ناجما عن اثارة الكظر او الغدة النخامية. ان مستحضر اندمويل ليس مستكنا عابدا بسبب لذلك يجب حصر استعماله الاصابات المذكورة تحت "الحالات التي يستعمل فيها الدواء" وخاصة الحالات التي لا تستجيب للتدابير التقليدية المحافظة.

يخفف اندمويل اعراض المرض. انه يخفف الالم، ويخفض الحرارة، والانتفاخ، والمضض ان هذا المستحضر كسائر العقاقير المضادة للالتهابات، لا يغير مجرى المرض المسبب.

الحالات التي يستعمل فيها الدواء:

يوصف مستحضر اندمويل في المراحل الحادة للحالات التالية:

- التهاب المفاصل الشبية بالروماتزمي.

- الانتهاب العظمي المفصلي.

- التهاب المفصل المتردي في الورك.

- التهاب الصلب الاقسط.

- داء النقرس.

- الاضطرابات العضلية الصفلية الحادة، كالتهاب الاكياس الزلالية، والتهاب الازنار، والتهاب اغشاء الصلبي، والتهاب غمد الوتر، والتهاب محظطة الكف.

كما يوصف أيضا في الحالات التالية:

- الالم الظهر السفلي (المروف غادة بالصلب)

- الحمى (لفترة قصيرة كدواء اضائي للعلاجات التوعية)

- الالم، والالتهاب، والضرز، والادعما التي تعقب الجراحة في الانسان.

تبدأ المعالجة باستعمال ٢٥ ملليجرام مرتين او ثلاث مرات يوميا. فاذا لم

يحدث التحاوب المناسب للعلاج، تزداد الجرعات تدريجيا على دفعات مقدارها

٢٥ ملليجرام طبعا لحاجة المريض. وغالبا ما يحدث التحاوب المناسب للعلاج

عند استعمال عدد من الجرعات بمجموعها ١٥٠ ملليجرام في اليوم أو أقل ونادرا

ما تقضي الحاجة الى زيادة عدد الجرعات من ٢٠٠ ملليجرام في اليوم.

الاعتبارات الاخرى لتحين مقدار الجرعة.

ان بعض المرضى قد يحتاج الى عدد من الجرعات بمجموعها ١٥٠ الى ٢٠٠

ملليجرام في اليوم للتحكم الصحيح في اعراض المرض، الا انه يمكن في اغلب

الاحيان تخفيض مقدار الجرعات تدريجيا حتى يصل الى ٧٠ - ١٠٠ ملليجرام في

اليوم بصورة مستمرة. ونادرا ما تقضي الحاجة الى زيادة عدد الجرعات عن

٢٠٠ ملليجرام في اليوم (عند زيادة مقدار الجرعات ليصل الى هذا الحد او

ليصل أكثر من ذلك، تزداد نسبة ظهور الاعراض الجانبية، وخاصة الصداع

والاضطرابات المعدية المعوية التي قد تحدث وتستوجب تخفيض مقدار الجرعات

بصورة مؤقتة).

INDOMEL INDOMETHACIN

INDOMEL (indomethacin) is a highly nonsteroidal anti-inflammatory drug with marked analgesic and antipyretic properties. Its mode of action, like that of other anti-inflammatory drugs is known. However, its therapeutic action is not due to pituitary-adrenal stimulation.

INDOMEL is not a simple analgesic, and its use should be limited to these conditions listed under.

INDICATIONS, particularly those cases not responding to conservative measures.

INDOMEL affords relief of symptoms. It relieves pain, reduces fever, swelling and tenderness. As with all anti-inflammatory drugs, it does not alter the course of the underlying disease.

INDICATIONS

INDOMEL is indicated in active stages of:

Rheumatoid arthritis

Osteoarthritis

Degenerative joint disease of the hip

Ankylosing spondylitis

Gout

Acute musculoskeletal disorders, such as bursitis, tendinitis, tenosynovitis capsulitis of the shoulder.

It is also indicated for:

Low back pain (commonly referred to as lumbago)

Fever (as short term adjunct to specific therapy)

Pain, inflammation, trismus and edema following dental procedures.

DOSEAGE AND ADMINISTRATION

It is recommended that oral INDOMEL be taken with food, milk or an antacid.

Initially : 25 mg, 2 or 3 times a day. If the response is inadequate, gradually increase the dosage by increments of 25 mg, as required. Adequate response generally is achieved at a total daily dosage of 150 mg. or less. It is rarely necessary to exceed a daily dosage of 200 mg.

Transferring from other anti-inflammatory compounds to INDOMEL

1. Salicylates : When a response to INDOMEL has been obtained, the daily dosage of salicylate usually can be reduced and often stopped.

2. Steroids : If patients have been receiving corticosteroids, the steroid dosage often can be reduced gradually by 25 to 50 percent; in some patients the steroid can be discontinued gradually over a period of several weeks or months with close attention for any possible adverse steroid withdrawal effect.

3. Pyrazolones : INDOMEL may be used to replace the pyrazolones. As the dosage of INDOMEL is gradually increased to an effective level, the dosage of the pyrazolon compound should be reduced and eventually discontinued.

CONRAINDICATION

Children, pregnancy or lactation, active peptic ulcer, recurrent history of gastrointestinal lesions, sensitivity to acetylsalicylic acid or indomethacin.

SIDE EFFECTS

- Gastrointestinal reactions: nausea, vomiting, epigastric distress, abdominal pain, diarrhea, ulceration - single or multiple - of oesophagus, stomach, duodenum or small intestine.
- Hepatic reactions: jaundice and hepatitis.
- Dermatologic-hypersensitivity reactions: pruritus, urticaria, angio-neurtic edema, erythema nodosum, skin rashes.

HOW SUPPLIED

- INDOMEL is supplied in bottles of 30 capsules. Each capsule contains 25 mg. indomethacin.
- INDOMEL Suppository in box of 5 suppositories of 100 mg.

التحول من المعالجة بالمركات الاخرى المضادة للالتهاب الى مستحضر اندوميل:
١ - السليسلات: عندما يتم التجاوب لمستحضر اندوميل، يمكن عادة تخفيض مقدار الجرعات اليومية من السليسلات كما يمكن التوقف عن استعمالها في اغلب الاحيان.

٢ - الستارويدات: اذا كان المرضى يتناولون الستارويدات القشرية، يمكن في اغلب الاحيان تخفيض مقدار الجرعات تدريجيا ٢٥ - ٥٠ بالمئة. كما يمكن التوقف عن استعمال الستارويدات تدريجيا عند بعض المرضى عن كتب لاحتمال ظهور ردود فعل مماثلة لتنجبة لسحب الستارويدات من المعالجة.
٣ - البيرازولونوات - يمكن استبدال البيرازولونوات بمستحضر اندوميل، وعندما تزداد الجرعات من اندوميل تدريجيا حتى تصل الى المستوى الفعال، يجب تخفيض مقدار الجرعة من مركب البيرازولون ثم التوقف عن استعماله.

الاعراض الجانبية:

- ردود الفعل المعدية المعوية: الغثيان، قلة الشهية للطعام، القيؤ، الام في أغشية المعدة، الام البطنى، الاسهال، التفرح -- المنفرد أو المتعدد -- في المريء، او المعدة، أو الاثنى عشر، أو الامعاء الدقيقة.
- ردود الفعل الكبدية: اليرقان والتهاب الكبد.
- ردود الفعل الجلدية الناتجة عن فوط الحساسية: الحكة، الشرى، والاورهما
الرعاية العصبية.

العيوة:

- كبسول في زجاجة سعة ٣٠ كبسولة ٢٥ ملغ.
- تحاميل عيوة خمسة تحاميل ١٠٠ ملغ.



PHARMADEX S.A.L.
KAHALE - LEBANON