

A<sup>®</sup> سولدكس

B<sup>®</sup> سولدكس

المكونات : سولدكس - A : ٦٠٠ ملغ باراسيتامول  
سولدكس - B : ١٥٠ ملغ باراسيتامول

المواصفات : سولدكس هو خافض للحرارة ومسكن للألم  
المفاعيل : يسكن سولدكس الألم عن طريق التنشيط النوعي على جهاز  
تمييز الألم في الجهاز العصبي المركزي . أما التأثير الخافض للحرارة  
فينتج عن تأثيره المباشر على مركز تنظيم الحرارة في تحت المهاد مما  
يسبب توسعا وعاتيا " محيطيا " وينتج عن ذلك زيادة ندف الدم عبر الجلد،  
تعرق وفقدان حرارة . يتأيض في الكبد وفرز في البول .

دواعي الاستعمال : يستعمل سولدكس كملاخ للاضطرابات  
الألمية كالصداع الوسيط، الألم العضلي الخفيف . يستعمل أيضا " في  
بعض الأمراض المترافقة مع حرارة وانزعاج كالرشح

موانع الاستعمال : يستحسن عدم اعطائه للمرض ذوي حساسية مفرطة  
على مادة باراسيتامول .

المقادير وكيفية اعطائها:

للبالغين : ٥٠٠ - ١٠٠٠ ملغ ٣ مرات يوميا حسب الحاجة  
للأطفال :

حسب ارشادات الطبيب

الأشكال الصيدلانية المتوفرة : علبه من ٥ تحاميل

فارماكس ش.م.ل.

SULDEX - A<sup>®</sup>

SULDEX - B<sup>®</sup>

Analgesic/Antipyretic

Composition :

Suldex - A : 600 mg Paracetamol

Suldex - B : 150 mg paracetamol

**DESCRIPTION :** Suldex is an analgesic and antipyretic agent

**ACTIONS :** Suldex produces analgesia through its selective depressant action on the pain receptor in the central nervous system. Reduction of fever results by its direct effect on the hypogthalamic heat-regulating center to produce peripheral vasodilation resulting in increase blood flow through the skin, sweating and heat loss. It is metabolized in the liver and excreted in the urine.

**INDICATIONS :** Suldex is indicated for the relief of painful disorders such as simple headaches, minor muscular aches, and menstrual cramps. It is also indicated in conditions accompanied by discomfort and fever such as common colds and viral infections.

**CONTRAINDICATIONS :** Suldex is contraindicated in patients with known hypersensitivity to the drug

**DOSAGE & ADMINISTRATION :**

**Adults :**

500 - 1000 mg. 3-4 times daily as needed.

إن هذا الدواء :

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
  - اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الإستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
  - فالطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وينفعه وضرره .
  - لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
  - لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية .
  - لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال .
- فارمادكس ش.م.ل.

Children :

as directed by physicianl

Availability :

Suldex - A :Box of 5 SUPPO.

Suldex - B :Box of 5 suppo.

This is a medicament

- A medicament is product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament.
- The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.
- Do not interrupt by yourself the period of treatment prescribed for you.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.

Keep medicaments out of reach of children.

**PHARMADEX S.A.L.**  
**KAHALE - LEBANON**

